

Gaceta

SRID

INHALABLES

SRID: Sistema de Reporte de Información en Drogas

El sistema SRID proporciona un panorama permanentemente actualizado del consumo de drogas, detectar oportunamente los cambios ocurridos en el mismo y estimar la trayectoria del problema en la Ciudad de México desde 1986 hasta la fecha.

¿Qué es?

Se les llama así a las sustancias volátiles a temperatura ambiente de las que se abusa casi exclusivamente por vía de inhalación. Estas sustancias se agrupan en cuatro categorías: disolventes volátiles industriales, nitritos, aerosoles y gases.¹

¿Qué son
los inhalables?

Se refiere así al uso intencional de productos que están disponibles en mercados, tiendas, ferreterías, supermercados y farmacias, con el propósito de intoxicarse.

Abuso de
inhalables

1. Ortiz, A; Meza, D; Martínez, R; Curiel, N. Glosario del argot de drogas. México: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México IAPA/Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz INPRFM 2013.

Entra directamente a la sangre por medio de los pulmones, resultado de la inhalación por la nariz o la boca provocando que llegue al cerebro causando:

- ❖ Mareos, náuseas, diarrea.
- ❖ Palpitaciones, dolor de cabeza, dificultades para respirar.
- ❖ Visión borrosa, tos, sangrado nasal.
- ❖ Aturdimiento, desorientación, juicio alterado.
- ❖ Sensación de mayor libertad y confianza.
- ❖ Aumentan el ritmo cardiaco, se produce excitación y risas inmotivadas.
- ❖ Euforia, sensación de bienestar y felicidad.
- ❖ Conductas de riesgo, como la de sufrir accidentes.

Efectos
inmediatos^{2,3}

- ❖ Grietas en labios o cara, náusea, enrojecimiento de nariz y ojos, así como sangrados nasales.
- ❖ Dolores de cabeza, debilidad muscular, bajo peso, vomito y dolores abdominales.
- ❖ Irritabilidad, agresividad y conductas violentas. Ansiedad, apatía, depresión
- ❖ Disminución paulatina del olfato. Dermatitis, problemas respiratorios
- ❖ Hepatitis, daño pulmonar y renal.
- ❖ Anemias o leucemias, perdida de memoria, psicosis
- ❖ Daño cerebral incluyendo alucinaciones y delirios.

Efectos a largo plazo^{2,3}

activo
tolueno
pegamento
disolvente
FZ10
Inhalables
mamilata
PVC
comprimido
solvente
chemo
aire
thiner
flanes
poppers
gasolina
cemento
barniz
archi
monas
pintura
lata

NOMBRES POPULARES
O ARGOT

El Reporte SRID de noviembre 2012 registró:

- ❖ 880 casos de usuarios de sustancias, de los cuales 48.2% reportaron haber consumido inhalables, 80.0% mariguana y 42.3% cocaína.
- ❖ Los inhalables representan el 48.2% del uso de sustancias alguna vez en la vida
- ❖ La edad de inicio en el consumo de inhalables se registra entre los 15 y 19 años con 41.9%
- ❖ El nombre de inhalables más reportado es Activo(75.6%)





Para atención en pre consulta en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

<http://www.inprf.gob.mx/clinicos/preconsulta.html>

Comunicarse al 41605372 desde el D.F.

ó al 018006114488 del Interior de la República.

Para comentarios relacionados con esta gaceta

glosariodrogas@gmail.com

ó solicitar información del SRID

<http://www.inprf.gob.mx/psicosociales/sridrepo.html>